

IGD

Infección Gonocócica Diseminada

IGD ha sido diagnosticado en 7 hombres y mujeres viviendo en los condados de King y Snohomish. Todas estas personas fueron hospitalizadas y tratadas, mientras 4 de ellos requerían cirugía. La mayoría de estas personas usaba cocaína en forma de piedra "crack" o tenía relaciones sexuales con alguien que hacía lo mismo. Uno de ellos era una persona sin hogar.

El IGD resulta cuando uno se infecta con una especie rara de la bacteria, *Neisseria gonorrhoeae*. Si no se trata, la gonorrea puede pasar por la circulación sanguínea y causar IGD. Allí es posible que llegue infectar los huesos, el cerebro o el corazón.

Síntomas comunes de la gonorrea

- Flujo anormal de la vagina, el pene o el recto
- Dolor al orinar
- Dolor del abdomen para mujeres

Muchas mujeres y algunos hombres no experimentan síntomas

Síntomas de IGD

- Una articulación o más que sea dolorosa, sensitiva o hinchada
(Muchas veces en las rodillas, los codos o los dedos)
- Llagas o granos llenos de pus en la piel
(Pueden parecer sangrientas o la piel se puede ver de color negro)

Si usted piensa que pueda tener la gonorrea o si usa cocaína en forma piedra "crack" o tiene relaciones sexuales con alguien que hace lo mismo, hágase la prueba.

Los condones pueden proteger a usted y a sus parejas sexuales.

**¡Si tiene cualquiera de los síntomas de IGD,
vaya a la SALA DE EMERGENCIAS...inmediatamente!**

Lleve este papel para que lo atiendan rápido.

¡La gonorrea puede ser tratada y curada!
Es muy importante que la diagnostiquen lo más pronto posible
y comenzar con tratamiento inmediato.